

**SEE PATSIENDIKAART ON MÕELDUD AINULT NEILE PATSIENTIDELE, KES KASUTAVAD METOTREKSAATI SISALDAVAT RAVIMIT ARTRIIDI JA PSORIAASI RAVIKS.
KUI KASUTATE METOTREKSAATI MÕNEL NIMETATUD NÄIDUSTUSTEST, PEATE METOTREKSAATI VÕTMA AINULT 1 KORD NÄDALAS.**

Kirjutage siia ravimi manustamise nädalapäeva täispikk nimetus: _____
Ärge võtke rohkem kui teile määratud annus.

Üleannustamine võib põhjustada raskeid kõrvaltoimeid ja võib lõppeda surmaga. Üleannustamise sümptomiteks võivad olla nt kurguvalu, palavik, suuhaavandid, kõhulahtisus, oksendamine, nahalööve, veritsus või ebatavaline nõrkus. Kui arvate, et olete võtnud ravimit rohkem kui ette nähtud, tuleb kohe ühendust võtta arstiga.

Näidake alati seda kaarti tervishoiutöötajatele, kes ei tea teie ravist metotreksaadiga, et teavitada neid ravimi üks kord nädalas manustamisest (nt haiglaravile sattumisel, raviteenuste muutumisel).

Lisateavet lugege palun pakendis olevast infolehest.