

## Kontroll-leht metotreksaadi väljastavatele õdedele ja haiglaapteekritele - teave ravivigade riski minimeerimiseks

### METOTREKSAADI TABLETTIDE MANUSTAMINE TAVALISELT AINULT ÜKS KORD NÄDALAS

#### Igapäevasest manustamisest tuleneva juhusliku üleannustamise vältimise meetmed

Enne metotreksaadi väljastamist lugege see teave hoolikalt läbi. Ravimi täieliku kirjelduse ja annustamise soovitusel leiate ravimomaduste kokkuvõttest (SPC).

See kontroll-leht on ette nähtud õdedele ja haiglaapteekritele, kes annustavad ja väljastavad metotreksaadi või suhtlevad metotreksaadi kasutavate haiglaravil olevate patsientidega ning selle eesmärk on tagada ravimi korrektne kasutamine. Selle juhendi peamine eesmärk on aidata leevendada ravivigade võimalikku riski.

Metotreksaadi ebaharilik igapäevane annustamisskeem võib olla patsientide jaoks segane ja on soodustanud ravivigu, millest mõned on lõppenud surmaga. Vigu esineb kõigil tasanditel, sealhulgas vigu väljakirjutamisel, vigu apteegist väljastamisel, hooldajate või sugulaste poolt sooritatud vale manustamise tõttu, samuti patsientide endi poolt põhjustatud valede manustamiste tõttu. Vigu võib esineda nii ravi alguses kui ka mistahes ajal, kui ravi on juba välja kujunenud. Kõik muudatused on kriitilised, nt alates eeltäidetud süstaldelt (subkutaanne manustamine) tablettidele üleminekul või asutuse või hooldaja vahetuseni.

Suhtlus mängib üliolulist rolli. Tervishoiutöötajad saavad ohutust parandada, pakkudes patsientidele/hooldajatele selgeid suulisi ja kirjalikke juhiseid selle kohta, kuidas ja millal metotreksaadi annust võtta.

### Kontroll-leht õdedele

| Mida teha   | Tehtud |
|---|--------|
| Kontrollige, kas retsept sisaldab järgmist teavet: Üks kord nädalas võetavate tablettide tugevus ja arv                     |        |
| Kontrollige, kas retsept sisaldab järgmist teavet: Nädalapäev, millal igapäevane annus tuleb võtta                          |        |
| Enne ravimi väljastamist patsiendile kontrollige üle „ <b>õige tugevus ✓ õige annus ✓ õige sagedus = üks kord nädalas ✓</b> |        |

#### Patsiendikaart

Patsiendikaart on metotreksaadi tablettide pakendis kas välispakendil või pakendi sees. Kaarti saab hõlpsalt eemaldada, nii et patsient saaks seda kogu aeg kaasas kanda.

Patsiendikaart on vahend, mille abil:

- Tuletada patsientidele/hooldajatele meelde, et nad kasutaksid ravimit ainult üks kord nädalas
- Teavitada patsiente üleannustamise sümptomitest ja sümptomite ilmnemisel kasutusele võetavatest meetmetest
- Soovitada patsientidel näidata kaarti ja teavitada tervishoiutöötajaid, kes ei ole metotreksaatravi üks kord nädalas annustamise skeemiga kursis (nt haiglaravil, hooldajate vahetusel)

- Kaardile tuleb kirjutada metotreksaatravi annustamise nädalapäev.

### **Raviõde**

Teavitage patsienti ja tema hooldajaid, et nad oleksid valvsad metotreksaadi toksilisusele viitavate sümptomite osas ja juhendage neid üleannustamise kahtluse korral viivitamatult arsti poole pöörduma. Üleannustamise sümptomiteks on nt kurguvalu, palavik, suuhaavandid, kõhulahtisus, oksendamine, nahalööbed, veritsus või ebatavaline nõrkus.

Ravi ajal tuleb patsiente asjakohaselt jälgida, et võimaliku toksilise mõju või kõrvaltoimete sümptomeid saaks võimalikult vähese viivitusega tuvastada ja hinnata. Patsiendile tuleks meelde tuletada regulaarsete kontrollide, sealhulgas laboratoorsete uuringute tähtsust.

Ravimi kahtlustatavatest kõrvaltoimetest ja vale igapäevase manustamise juhtudest teatamine on oluline. See võimaldab pidevalt jälgida ravimi kasu ja riski suhet.

Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist kahtlustatavatest kõrvaltoimetest teatada [www.raviamet.ee](http://www.raviamet.ee) kaudu või müügiloa hoidjale *Orion Corporation* või e-posti ([orionpharmaeesti@orionpharma.ee](mailto:orionpharmaeesti@orionpharma.ee)) või telefoni teel (+372 56295735).

Need hariduslikud materjalid saab alla laadida ja välja printida järgmistelt veebilehtedelt:

<...>

Ettevõtte kontaktandmed:

### **Orion Pharma Eesti OÜ**

Mustamäe tee 6b, Tallinn 10621, Eesti

Tel: +372 66 44 550