

POTILASKORTTI

Apixaban Orion

(apixabaani)

- Tämän kortin on oltava aina potilaan tai potilasta hoitavan henkilön mukana
- Varmista, että käytössäsi on viimeisin versio

Pidä tämä kortti aina mukanasasi.
Näytä tämä kortti apteekkihenkilökunnalle,
hammaslääkärille tai muulle sinua hoitavalle
terveydenhuollon ammattilaiselle.

**Saan verenhyytymistä estävää
Apixaban Orion -hoitoa (apiksabaani)
verisuonitukosten estämiseksi.**

TIETOA POTILAILLE

- Ota Apixaban Orion -valmistetta säännöllisesti ohjeiden mukaan. Jos unohdat annoksen, ota se heti kun muistat ja jatka sitten hoitoa tavanomaisen aikataulun mukaan.
- Älä lopeta Apixaban Orion -valmisteen käyttöä keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä sinulla on riski saada aivohalvaus tai muita komplikaatioita.
- Apixaban Orion -valmiste auttaa ohentamaan verta. Tämä voi kuitenkin suurentaa verenvuoto-riskiäsi.
- Verenvuodon merkkeihin ja oireisiin kuuluvat mustelmat tai ihonalainen verenvuoto, mustaksi värjäytyvä uloste, verinen virtsa, nenäverenvuoto, huimaus, väsymys, kalpeus tai heikotus, äkillinen vaikea päänsärky, veriyskä tai verioksennus.
- Jos verenvuoto ei lopu itsestään, **hakeudu heti hoitoon.**
- Jos tarvitset leikkaushoitoa tai sinulle pitää tehdä mikä tahansa kajoava toimenpide, kerro lääkärille, että käytät Apixaban Orion -valmistetta.

TIETOA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

- Apixaban Orion (apiksabaani) on suun kautta otettava antikoagulantti, joka vaikuttaa estämällä suoraan ja selektiivisesti hyytymistekijä Xa:ta.
- Apixaban Orion saattaa suurentaa verenvuoto-riskiä. Jos verenvuoto on voimakasta, lääkkeen käyttö on lopetettava välittömästi.
- Lääkeainepitoisuuksia elimistössä ei tarvitse mitata rutiinimaisesti Apixaban Orion -hoidon aikana. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi yliannostuksen ja hätäleikkauksen yhteydessä, antifaktori Xa-määrityksestä kalibroidulla kvantitatiivisella testillä voi olla hyötyä. Näitä ei suositella: protrombiiniaika (PT), international normalised ratio (INR) ja aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (aPTT) – katso valmisteyhteenvedo.
- Apiksabaanin antifaktori Xa -aktiivisuuden vaikutuksen kumoamiseksi on saatavilla lääkeaine.

OLE HYVÄ JA TÄYTÄ TÄMÄ OSIO ITSE TAI PYYDÄ LÄÄKÄRIÄ TEKEMÄÄN SE

Potilaan nimi

Syntymäaika

Käyttöaihe

Annos _____mg kahdesti vuorokaudessa

Lääkärin nimi

Lääkärin puhelinnumero

