

ERITYISTIEDOTE POTILAALLE

Leflunomide Orion

Tämä tiedote on laadittu Leflunomide Orion (leflunomidi) -pakkausselosteen perusteella ja on tarkoitettu luettavaksi pakkausselosteen lisäksi. Pakkausseloste toimitetaan lääkepakkauksen mukana.

Tärkeää tietoa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi tai suunnittelevat raskautta, ja isäksi haluaville miehille

JOS OLET NAINEN, JOKA VOI TULLA RASKAAKSI TAI SUUNNITTELEE RASKAUTTA

Leflunomide Orion voi suurentaa vakavien sikiövaurioiden riskiä

Lapsen kehityshäiriön riski voi suurentua, jos

- olet raskaana, kun aloitat Leflunomide Orion hoidon, tai
- tulet raskaaksi Leflunomide Orion hoidon aikana tai
- tulet raskaaksi ennen kuin olet lopettanut Leflunomide Orion hoidon ja suorittanut jäljempänä kuvatun lääkkeen elimistöstä poistamismenetelmän (wash-out) tai
- tulet raskaaksi 2 vuoden kuluessa Leflunomide Orion hoidon lopettamisesta.

LEFLUNOMIDE ORION VALMISTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET

Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, sinun ja kumppanisi on pyrittävä ehkäisemään raskaaksi tuleminen kaikin tavoin, esimerkiksi molempien osapuolien käyttämällä, lääkärin suosittelemilla luotettavilla ehkäisymenetelmillä, jos

- käytät parhaillaan Leflunomide Orion valmistetta tai
- olet lopettanut Leflunomide Orion hoidon ja suoritat parhaillaan lääkkeen elimistöstä poistamismenetelmää (wash-out) tai
- olet lopettanut Leflunomide Orion hoidon alle 2 vuotta sitten.

On ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, että otat yhteyden lääkäriisi VÄLITTÖMÄSTI, jos kuukautisesi ovat myöhässä tai jos muusta syystä epäilet olevasi raskaana.

LEFLUNOMIDIN ELIMISTÖSTÄ POISTAMISMENETELMÄ (WASH-OUT)

Leflunomide Orion valmisteiden käytön lopettamisen jälkeen lääkäri määrää sinulle lääkkeen elimistöstä poistamismenetelmän (wash-out).

Sen tarkoituksena on poistaa lääke elimistöstä nopeasti ja tehokkaasti. 11 päivää kestävä lääkkeen elimistöstä poistamismenetelmän (wash-out) ajan otat tiettyjä lääkkeitä, jotka nopeuttavat leflunomidin poistumista elimistöstäsi. Tämän jälkeen laboratoriossa tehdään kaksi verikokeita, joista toinen tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua ensimmäisestä. Verikokeilla varmistetaan, että leflunomidin pitoisuus elimistössä on pienentynyt riittävästi. Jos leflunomidipitoisuus on edelleen liian korkea, uusi lääkkeen elimistöstä poistamismenetelmäjakso voi olla tarpeen.

Kun kahdella erillisellä verikokeella on varmistettu, että leflunomidi on poistunut elimistöstäsi riittävässä määrin, sinun on odotettava vielä vähintään kuusi viikkoa ennen raskauden yrittämistä.

Ilman lääkkeen elimistöstä poistamismenetelmää (wash-out), lääkeainepitoisuuden pieneneminen riittävän alhaiselle tasolle voi kestää jopa kaksi vuotta.

JOS OLET ISÄKSI HALUAVA MIES

Leflunomidin siirtymistä siemennesteeseen ei voida sulkea pois, joten luotettavan ehkäisyn käyttö Leflunomide Orion hoidon aikana on varmistettava.

Jos haluat hankkia lapsen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa. Hän antaa sinulle ohjeet Leflunomide Orion hoidon lopettamisesta ja sitä seuraavasta lääkkeen elimistöstä poistamismenetelmästä (wash-out), (joka on kuvattu edellä).

Kun on varmistettu, että leflunomidi on poistunut elimistöstäsi riittävässä määrin, sinun on odotettava vielä vähintään kolme kuukautta ennen raskauden yrittämistä.

Jos haluat lisätietoa, ota yhteys lääkäriisi.

