

Karta pacjenta dotycząca leku Oritop – dla kobiet i dziewcząt w wieku rozrodczym
Antykoncepcja i zapobieganie ciąży

Co należy wiedzieć

- Oritop jest lekiem przeznaczonym do stosowania w leczeniu napadów padaczkowych i zapobieganiu migrenie.
- Lek Oritop przyjmowany w okresie ciąży może poważnie zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

Co należy zrobić

- Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania oraz instrukcją dla pacjenta.
- W trakcie leczenia topiramatem i przez co najmniej 4 tygodnie po przyjęciu ostatniej dawki topiramatu należy stosować wysoce skuteczną metodę antykoncepcji. Lekarz doradzi, która metoda będzie najbardziej odpowiednia dla pacjentki.
- Przynajmniej raz w roku należy udać się do lekarza w celu kontroli leczenia.
- Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli pacjentka planuje mieć dziecko, nie należy przerywać stosowania antykoncepcji przed konsultacją z lekarzem.
- Jeśli pacjentka choruje na padaczkę, nie należy przerywać stosowania topiramatu, dopóki lekarz tak nie zaleci, ponieważ stan pacjenta może się pogorszyć.

Należy poprosić lekarza o wydanie Przewodnika dla pacjenta lub zeskanować ten kod QR.



URL: http://qr.orionproductsafety.com/siteassets/topiramate/poland/topiramate_patient-guide_pl_em-142536_-2024-03-01.pdf

Tę kartę należy zachować.